

Safe drugs during pregnancy & Lactation

الأدوية الآمنة أثناء الحمل و الرضاعة

قواعد عامة عند وصف الأدوية في الحمل أو الرضاعة

- تجنب وصف الأدوية بقدر الامكان خصوصاً في أول 3 شهور من الحمل 1st trimester
- استخدم الأدوية فقط اذا كانت Benefits أكبر من Risks
- استخدم local preparations قبل اللجوء الى systemic drugs
- عند استخدام systemic drugs استخدم أقل جرعة ممكنة

Category	Pregnancy آمن في الحمل	Breast-feeding آمن في الرضاعة
Antibiotics المضاد الحيوي	1. Penicillins 2. Cephalosporins 3. Erythromycin Tetracycline – Quinolones – Aminoglycoside - Chloramphenicol ممنوعين في الحمل و الرضاعة	
	<u>Nitrofurantoin</u> Uvamine retard caps كبسولات لالتهابات مجري البول آمنة في الحمل فقط ماعدا الشهر الأخير من الحمل	
Analgesics المسكنات	Paracetamol المسكن و خافض الحرارة الأكثر أماناً في الحمل و الرضاعة <u>NSAIDS</u> e.g. Brufen – cataflam يمكن استخدامها في الحمل أثناء 2 nd trimester فقط	

Gastro-enteritis

النزلة المعوية

Diagnosis

النزلة المعوية من أشهر المشاكل التي هتقابلها في استقبال الباطنة

➤ Presentation

Diarrhea ± vomiting & abdominal pain & fever

لازم يبقى في (إسهال) عشان تقول دي نزلة معوية

قد يكون مصحوبا بـ (ترجيع - مخص - سخونية) أو لا

➤ Examination

لازم بعد سماع History تعمل Abdominal examination وأهم حاجة :

Exclusion of Acute abdomen

لأن وجود Tenderness أو Rigidity أو Guarding يعني أن المشكلة جراحية

مش باطنة و لذلك يطلق عليها "Surgical abdomen"

➤ 1ry or 2ry ?

معناه ان النزلة المعوية سببها مشكلة في الجهاز الهضمي نفسه : 1ry GE

مشكلة تانية و من ضمن أعراضها مشاكل في الجهاز الهضمي : 2ry GE

2ry causes are important & fatal

لا تنسي فحص Pupil بالكشاف في أي حالة GE

❖ Botulism تسمم الفسيخ

✓ Dilated fixed pupils

✓ Ptosis + generalized weakness جسمه مرخي تماماً و جفونه ساقطة

✓ NO gag reflex لما تلمس الحلق بخافض لسان مش هتلاقيه عايز يرجع

❖ Organo-phosphorus Poisoning تسمم المبيدات الحشرية

Pinpoint pupils + salivation , lacrimation , urination كل حاجة سايبة

❖ Zinc phosphide قرص الغلة

Hx of intake + severe irritability & shock

➤ **If I try, what is the organism ?**

Viral GE	Bacterial GE	Parasitic GE
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Most common</u> - Low grade fever - Non-toxic patient - Profuse watery diarr. <p>أشهر سبب للنزلة المعوية يبقى في سخونية بسيطة و المريض شكله مش Toxic</p>	<ul style="list-style-type: none"> - High grade fever - Toxic look - Bloody diarrhea may occur <p>يبقى في سخونية عالية و المريض شكله Toxic ± دم في البراز</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diarrhea + cramps ± blood or mucus - Peri-anal itching <p>بيجي باسهال و مخص بدون ترجيع أو سخونية أحياناً معاه دم أو مخاط التشخيص بتحليل البراز</p>
<p>بيخف في خلال اسبوع بيحتاج علاج للأعراض فقط لا تستخدم المضادات الحيوية</p>	<p>بيخف في خلال اسبوع ممكن يحتاج مضاد حيوي + علاج الأعراض</p>	<p>بيحتاج علاج للديدان + علاج الأعراض</p>

➤ **Complicated or not ?**

الحاجة اللي بتحتاج علاج طارئ في النزلات المعوية هي "الجفاف"
لو مفيش جفاف العلاج هيكمل في البيت

❖ **Diagnosis of dehydration**

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Delayed Skin turgor | لما تشد جلد البطن هيرجع ببطئ شديد |
| 2. Dry mucous memb. | هتبص على اللسان هتلاقيه Dry |
| 3. Sunken eye | هتلاقي العين مشفوفة لجوة |
| 4. Oliguria | لو سألت على البول هتلاقيه قليل جداً |

Oliguria is the surest sign of dehydration

ER management

أهم حاجة علاج Dehydration لو موجود

تعطي المحاليل حتى تتحسن أعراض الجفاف (يفضل Ringer لتصحيح نسب الاملاح)

في ماعدا ذلك هتدي أمبولات علاج أعراض النزلة (مضادات القيئ + التقلصات)

Primperan + **Visceralgine** أمبول

عضل أو تضاف على 250 سم محلول ملح أو رينجر وتعطي IV infusion

توجد أمبولات تحتوي على (مضاد للتقلصات + مسكن)

يمكن استخدامها بدلاً من Buscopan , Viscerlagine

Spasmofen ampoule (hyoscine + ketoprofen)

ممنوع تدي أي مسكن للمغص الا بعد استبعاد Acute abdomen
مسموح بـ Anti-spasmodics فقط

Home treatment

1. Antibiotics

امتي استخدم المضاد الحيوي في النزلة المعوية ؟

تستخدم المضادات الحيوية في Bacterial GE فقط

و معظم المراجع بتأكد ان النزلة المعوية البكتيرية تتحسن بدون مضاد حيوي في خلال 10 – 7 أيام إلا في حالات Bloody diarrhea التي يكون سببها غالباً Shigella أو Salmonella و يفضل استخدام Quinolones

في مصر الروشتة التي لا تحتوي على مضاد حيوي في النزلة المعوية لا يعترف بها

لذلك يتم وصف المضادات الحيوية في أي دور نزلة معوية و ستواجه صعوبة شديدة في مقاومة ذلك لكن يمكنك على الأقل عدم وصف المضاد الحيوي اذا كنت متأكداً من وجود Viral or Parasitic GE أو كتابته في الروشتة و اعطاء تعليمات للمريض بعدم استخدامه الا اذا لم يحدث أي تحسن في خلال 5 أيام

Gastro-enteritis is usually cause by Gram -ve bacteria

و لذلك مجموعات المضاد الحيوي الفعالة ضده هي

❖ Quinolones (Ciprofloxacin)

Ciprofar 500 tab

10 tab .. 20 LE

Cipro 500 tab

10 tab .. 11.5 LE

Ciprobay 500 tab الأغلي

10 tab .. 46 LE

قرص كل 12 ساعة قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين لمدة 5 أيام

(يتأثر امتصاصه بالألبان و الأكل الغني بالكالسيوم لذا يفضل تناوله بعيداً عن الطعام)

المضاد الحيوي الأفضل في حالات Salmonella (Typhoid) & Shigella

Headache

الصداع

Diagnosis

➤ History

- Onset, course, duration بدأ امتي ؟ بيقبل او بيزيد ؟
- Site, character مكانه فين ؟ الألم نوعه ايه ؟
- What ↑ & ↓ بيزيد بايه و بيقبل بايه ؟
- Associated symptoms معاه (ترجيع-سخونية- تشنجات- توهة) ؟

امتي أقلق من مريض بيشتكى من صداع و أطلب أشعة مقطعية ؟

RED Flags for headache (SNOOP)

(Urgent CT & referral to a specialist)

1. **Systemic symptoms**
High fever – Persistent vomiting – Neck rigidity
2. **Neurological symptoms**
Disturbed consciousness – Seizures – Focal neurological signs
3. **Onset** : Sudden , Severe
4. **Onset** : Above 40 years
5. **Previous headache with different characters**

في الحالات اللي جاية الاستقبال بصداع

NEVER MISS Meningitis & Encephalitis

1. **Meningitis**

Fever – disturbed consciousness – meningism

سخونية + فقدان في الوعي + رقبته محجرة لما تيجي تشنيها

2. **Encephalitis**

Fever - disturbed conscious. – seizures – focal neuro. lesion

سخونية + فقدان في الوعي + تشنجات أو مشكلة عصبية في ذراع أو قدم

➤ **Ask about 8 common causes of chronic headache**

لو مفيش حاجة تستدعي التعامل مع الصداع كحالة طوارئ
هيتم التعامل مع الحالة كحالة عيادة و يتم استبعاد الأسباب المشهورة للصداع
هتسأل عن **8 حاجات** من أشهر أسباب الصداع المزمن أولاً

1. **Eye** : Error of refraction

هتسأل في مشكلة في النظر ولا لأ ؟

هتطلب كشف نظر في آخر الكشف لو ملقيتش سبب ثاني للصداع
عشان في أحيان كتير لو في ضعف في النظر بسيط أو مقاس النظارة
محتاج يتغير بيبقى في صداع لكن العيان مش واخد باله إلا من الصداع بس

2. **Nose** : Sinusitis

هتسأل عندك جيوب أنفية ولا لأ ؟

صداع الجيوب الأنفية يتميز بأنه بييجي في الجبهة أو على جانبي الأنف و بيزيد
بالضغط على هذه الأماكن + الألم بيزيد لما العيان بيوطي لقدام في وضع الركوع

3. **Ear** : Otitis Media or Externa

هتسأل العيان في وجع في ودانك ؟ في افرازات بتطلع منها ؟

4. **Mouth** : Tooth pain

هتسأل العيان عندك مشكلة أو ألم في الأسنان ؟

أحياناً تبقى المشكلة في الأسنان والمريض بييجي
بصداع و مايقاش عارف انه بسبب مشكلة الأسنان

5. **Fever & any source of infection e.g. common cold**

هتسأل على أعراض البرد ؟

(سخونية – كحة – رشح – ألم في الزور – تكسير في العضم)
في حالات كتير جداً بيبقى عندها دور برد عادي بس المريض يشتكي من الصداع

6. **Chronic constipation**

الامساك المزمن من الأسباب اللي ممكن تسبب صداع مزمن

ER management

لو المريض جاي الاستقبال بتشنجات هتتصرف معاه ازاى ؟

Exclude Hypoglycemia in any patient with convulsions

لازم تعمل تحليل سكر عشوائي لأي حالة جاية بتشنجات

Any patient with convulsions + fever , exclude :

Meningitis & Encephalitis

+ **في الأطفال** : التشنجات الحرارية
بتحصل غالباً بين (5 شهور – 5 سنين)

أثناء التشنجات During seizure

1. Oxygen by mask تحطه على أوكسجين
2. Recovery position تنيمه في وضع الافاقه
3. Suction of secretion تشفط أي افرازات (لو متاح)
4. Anticonvulsant

❖ Diazepam

Neuril ampoule (10 mg in 2 ml)

Amp .. 0.5 LE

الجرعة في الكبار

امبول يتحل في 10 سم ملح و يعطي وريد ببطئ أو عضل بعمق

الجرعة في الأطفال

(ممنوع في الأطفال أقل من 6 شهور)

شرطة لكل كجم (1 سم / 10 كجم) بدون تخفيف وريد ببطئ أو عضل بعمق

لو مش عارف تركيب كانيولا : ممكن تدي نفس الجرعة Rectal

- **شرطة = 0.1 سم** على **السرنية العادية = 10** وحدات على **سرنية الانسولين 100**
- **لو الجرعة أقل من 1 سم** : تسحب الجرعة بسرنية انسولين أفضل
- **لو الطفل أكبر من 20 كجم** : الجرعة = 2 سم = أمبول و يتم تخفيفه مثل الكبار

التخدير Local anathesia

هتستخدم ايه ؟

- **Mepacaine (1.8 ml)** الكريول الأحمر
ده تقدر تستخدمه في أي جرح (يكفي جرح واحد)
- **Mepacaine –L (adrenalized)** الكريول الأخضر
حلو للجرح اللي بينزف جامد (ممنوع في Fingers و Toes و Penis)
- **Xylocaine 2% vial (50 ml)** الفيال الكبير اللي في المستشفى
- **Lido / Lignocaine spray** يستخدمه في الجروح السطحية

هتسحب قد ايه ؟

هتسحب كمية معقولة تكفي الجرح لكن ماتزيدش عن الحد الأقصى ولو المريض محتاج خياطة كتير ممكن تخفف المخدر قبل ما تشتغل بيه 1 سم محلول ملح لكل 2 سم مخدر أو في الحالات الشديدة بيدخل عمليات و يتخيط بتخدير كلي

Maximum dose : 5 mg / Kg

مثلاً : شخص وزنه 70 كجم = الحد الأقصى للمخدر حوالي 20 سم

Suspect toxicity if : headache, drowsiness, circumoral numbness

هتحن فين ؟

بتحن في أطراف الجرح **Intradermal** مش Subcutaneous

طب ازاى اتأكد اني حقنت جوة الجلد مش تحت الجلد ؟

- Swelling of edges هتلاقي أطراف الجرح بتتنفخ
- Resistance on injection هتس بمقاومة أثناء الحقن
- Pain on injection المريض هيتألم أثناء الحقن

المخدر بيشتغل قد ايه ؟

45 – 60 دقيقة

Anti-Cough medications

أدوية الكحة

موضوع أدوية الكحة موضوع طويل سيتم فيه شرح الفرق بين الأدوية الموجودة في السوق حيث أن أدوية الكحة في السوق كثيرة جداً و مختلفة في تركيبها و استخدامها على حسب نوع الكحة و السن و نوع الدواء اللي هتستخدمه و الحالة المادية للمريض اقرأ الموضوع للفهم جيداً ثم هيتم عرض روشات ثابتة في آخر الموضوع للتسهيل

Most common practical causes of DRY cough

أي حد بيشتكلي من كحة ناشفة اسأل على :

1. Current Flu or Flu that passed recently

- في أعراض تانية للأنفلونزا ؟ صداع ؟ تكسير ؟ سخونية ؟ احتقان في الزور ؟
- لسة طالع من دور برد ؟

دور الانفلونزا بيبقى مصحوب بكحة ناشفة و ممكن الكحة تطول بعده
فيما يسمى بـ Post-Viral cough .. لو الكحة كانت شديدة أو
طولت عن اسبوعين يبقى غالباً دخل في Acute Bronchitis

2. ACE inhibitors e.g. Capotril & Capoten

اسأل بتاخذ دوا للضغط ؟

أدوية الضغط من عائلة ACEI من أشهر آثارها الجانبية الكحة الناشفة

3. GERD

في حرقان عند فم المعدة أو حمو على صدرك بيزيد لما تيجي تنام ؟

ارتجاع الحمض من المعدة من أهم أسباب الكحة الناشفة
بسبب aspiration & irritation of acid و بالتالي لازم تستبعده

Drugs for "Dry cough" contains :

Cough suppressants
e.g. dextromethorphan

تعمل على مركز الكحة في المخ و تقلل من الكحة

Drugs for "Productive cough" contains :

ادوية الكحة ببلغم قد تحتوي على

- ❖ **Mucolytics** مذيب للبلغم
e.g. bromohexine, ambroxol
 - ❖ **Expectorant** طارد للبلغم
e.g. guainfenesin
 - ❖ **Bronchodilator** موسع للشعب
e.g. aminophylline, terbutaline
- كوبس للكحة عموماً بس يفضل لو المريض نفسه متضايق
- ❖ **Antihistaminic** للرشح و العطس المصاحب لأدوار البرد
e.g. chloropheniramine, oxomemazine

ممنوع استخدام مضادات السعال التي تستخدم في الكحة الناشفة

لأنها هتمنع الكحة اللي هي ميكانيزم طبيعي بيحاول يطرد البلغم برة الجسم
بعض الدكاترة فقط بتوصف شراب للكحة الناشفة في حالة الكحة ببلغم الشديدة
(ملعقة واحدة قبل النوم)

بعض الدكاترة بتفضل وصف الأدوية الطاردة و المذيبة للبلغم
صباحاً و عصرأ فقط و ليس مساءً لأنها هتزود الكحة أثناء النوم

قبل وصف أي دواء كحة لازم تسأل سؤالين

1. السن أد ايه ؟

2. كحة ناشفة ولا ببلغم ؟

Parasitic infection in adults

الديدان في الكبار

Presentation

أشهر الشكاوي اللي بتيجي بيها

1. Diarrhea , constipation , tenesmus
اسهال أو امساك أو تعنية (بيدخل الحمام كتير و يحزق و مايعملش حاجة)
2. Bloody or mucoid stool
البراز فيه مخاط أو دم
3. Abdominal cramps
مغص
4. Peri-anal itching
بيهرش كتير عند فتحة الشرج
5. Anemia
الديدان من أشهر أسباب الأنيميا

عشان تتأكد من وجد ديدان و تعرف نوعها اللي هتدي على أساسه العلاج

لازم تعمل تحليل براز

أشهر أنواع الديدان اللي هتقابلها

Entamoeba - Giardiasis – Oxyuris – ascaris – Anklystoma

Treatment

Entamoeba Hystolytica

1. Vegetative form

النوع ده من الأميبا سهل القضاء عليه و بيحتاج الجرعة العادية من Metronidazole

❖ Metronidazole

Flagyl 500 tab

20 tab .. 6 LE

Amrizol 500 tab

20 tab .. 5 LE

قرص 3 مرات يومياً لمدة أسبوع

❖ Secnidazole

Fladazole 500 tab

4 tab .. 10 LE

أربع أقراص بعد الأكل مرة واحدة فقط ولا تكرر

Tinea Versicolor

التينيا الملونة

Presentation

- Most common type of tinea usually occur in summer
أشهر نوع من التينيا غالباً يحصل في الصيف بسبب الجو الحار الرطب و العرق
- Commonly pale & less commonly dark lesions usually scaly & tend to merge forming larger patch usually occur in trunk, neck, proximal extremities
غالباً بقع فاتحة و أحياناً غامقة بتنضم و تكون بقع أكبر.. غالباً ييبقى عليها قشور و بتظهر أكثر حاجة على الظهر و الصدر و الكتف و الرقبة و الذراع و تحت الإبط .. في بعض الحالات بتسبب هرش

التينيا الملونة **غير معدية** ولا تنتقل من شخص لآخر على عكس كل أنواع التينيا الأخرى

Treatment

الحالة بتتحسن مع العلاج بس لازم تفهم العيان ان البقع ممكن تفضل أسابيع أو شهور على ما تروح خالص و ممكن تسبب أثر و ممكن تتكرر كل صيف

1. Instructions

الاستحمام باستمرار مع تنشيف المنطقة المصابة جيداً و ارتداء ملابس قطنية وواسعة

2. Topical anti-fungal

قبل وضع الكريم أو الشامبو تغسل المنطقة المصابة و تنشف جيداً

- In small lesions
يفضل استخدام **الكريم**
Dermatin cream (Clotrimazole 1%) 1.5 LE
Miconaz cream (Miconazole 2%) 3 LE
Batrafen cream (Ciclopirex 1%) 5 LE
Lamisil cream (Terbinafene 1%) 13 LE

دهان صباحاً و مساءً لمدة أسبوعين

▪ In large lesions or hairy area e.g. scalp يستخدم الشامبو

Nizapex shampoo (ketoconazole 2%) 17 LE

Nizoral shampoo (ketoconazole 2%) 23 LE

مرة واحدة يومياً لمدة أسبوعين

بيتساب لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء

▪ Resistant cases في الحالات المقاومة للعلاج

Selsun blue shampoo أفضل حاجة بس غالي 32 LE

مرة واحدة يومياً لمدة أسبوعين

بيتساب لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء

- يفضل الاستحمام بالشامبو مرة واحدة أسبوعياً في الصيف للوقاية من التينيا
- علاج التينيا في أي منطقة على الجلد يفضل أن يكون مصحوباً بعلاج وقائي لفروة الرأس بالشامبو (لعلاج أي إصابة قد تؤدي لسقوط قشور من الرأس و تكرار الإصابة)

3. Systemic anti-fungal (Fluconazole is the best)

Flucoral caps 2 capsules ..14.5 LE

Fungican caps 1 capsule .. 10 LE

كبسولتين الآن ثم كبسولتين بعد أسبوع

هتطلب من المريض ما ياخذش دش أول يوم و يبذل مجهود يخليه يعرق
لأن الدواء بيتم افرازه في العرق و بكدة يشتغل أحسن

روشتة لـ Tinea Versicolor

Rx/ Nizapex shampoo

شامبو مرة واحدة يومياً على البقع لمدة أسبوعين

(تغسل البقع ثم تنشف و يوضع الشامبو و يترك 10 دقائق ثم يشطف بالماء)

Rx/ Flucoral caps

كبسولتين الآن ثم كبسولتين بعد أسبوع

مع كتابة التعليمات على ظهر الروشتة

Tonsillitis

التهاب اللوز

Criteria of Bacterial Tonsillitis

- Age : 2-12 years (usually >4 years)
- Toxic-look
- High-grade fever
- Enlarged tender cervical LN
- Red spots over pharynx

Treatment

1. Analgesic & Antipyretic

استخدام الكمادات الباردة هو أهم خطوة لخفض الحرارة
يجب وضع الكمادات على (الرقبة – تحت الابطين – الجبهة – الأربية)

كيفية اختيار خافض الحرارة أو المسكن المناسب في الأطفال

- أقل من 6 شهور : Paracetamol فقط
- من 6 شهور – سنة : Paracetamol أو Ibuprofen
- أكبر من سنة : Paracetamol أو Ibuprofen أو Declophenac

▪ Ibuprofen

Brufen 100 mg/5ml syrup

6 LE

الجرعة في الأطفال : 10 - 15 mg/Kg/day

للتسهيل

$\frac{BW}{2}$ per dose (divided every 4 - 6 hours)

الجرعة الواحدة تساوي (الوزن/2) و تعطى الجرعة كل 4 – 6 ساعات لحد ما تنزل الحرارة

▪ Paracetamol

Cetal suppositories

5 supp .. 1.5 LE

Pyral suppositories

5 supp .. 1.5 LE

لبوسة كل 6 ساعات لحد ما تنزل الحرارة

Treatment of Type 2 DM

علاج مريض السكر من النوع الثاني

1. Patient education / Diet / Exercise

نفس النصائح الخاصة بمرض السكر و الأكل و ممارسة رياضة المشي

+

انقاص الوزن

تشجيع المريض على انقاص الوزن حيث يمثل زيادة الخلايا الدهنية في الجسم أحد الأسباب الرئيسية لنقص حساسية مستقبلات الانسولين

2. Oral anti-diabetic drugs

1. Biguanides (Metformine) تم شرحه سابقاً
2. Sulphonylureas أهم و أشهر مجموعة
3. Repaglinide
4. Combinations أدوية تحتوي على مجموعتين مع بعض

- أحسن حاجة تبدأ بـ
Metformin فقط أو Sulphonyl فقط أو Repaglinide فقط
- لو مفيش تحسن زود الجرعة أو استخدم حاجة فيها
Metformin + Sulphonylurea

Sulphonylurea

General Contraindications of sulphonylurea

1. Renal failure
2. Hepatic failure
3. G6PD deficiency

1. Gliclazide

➤ Trade names

Diamicon tab (80 mg)	20 tab .. 9 LE
Diamicon 30 MR tab	30 tab .. 14 LE
Diamicon 60 MR tab	30 tab .. 26 LE

➤ Dose

Starting dose = 40-80 mg & Maximum dose = 320 mg

Diamicon → نص قرص قبل الفطار و قبل العشاء يومياً

Diamicon MR → قرص قبل الفطار يومياً

• لو هتستخدم Diamicon العادي

لازم الجرعة تنقسم على مرتين (قبل الفطار و قبل العشاء) لأنه short acting
ابدأ ب نص قرص مرتين يومياً ولو عاوز تزود بعد كدة يبقى نص قرص و قرص و
هكذا بس بحد أقصى قرصين و قرصين يومياً

• Diamicon MR (Modified Release) لو هتستخدم

ده بيغطي اليوم كله و الجرعة بتتاخد مرة واحدة فقط
ابدأ ب قرص واحد يومياً و لو عاوز تزود استخدم تركيز أعلى أو زود عدد الأقراص

2. Glibenclamide

➤ Trade names

Daonil tab (5 mg)	20 tab .. 6 LE
Glibenase tab (5 mg)	20 tab .. 1.5 LE

➤ Dose

Starting dose = 5 mg (2.5 in old age) & Maximum dose = 15 mg

قرص قبل الفطار يومياً (نص قرص في كبار السن)

• بيتاخذ مرة واحدة لأنه long acting

• **ابدأ** ب قرص يومياً ماعدا كبار ولو عاوز تزود زود عدد الأقراص بحد أقصى 3 أقراص